


Lutte contre le frelon asiatique : Détectez les nids primaires !

D'avril à juin, soyons attentifs :

La majorité des nids primaires sont construits sur du bâti. Chacun a donc un rôle à jouer dans leur détection en inspectant régulièrement sa maison et ses dépendances à la recherche d'un nid. Tout abri ventilé peut abriter une fondatrice et son nid primaire.

A ce stade la destruction mécanique par écrasement du nid ET DE LA FONDATRICE est aisée (*détruire seulement le nid n'est pas efficace*).



Nid primaire en construction.

Si vous détectez un nid primaire dans lequel la fondatrice est seule :

Vous pouvez le détruire vous-même sans vous exposer, à l'aide d'un outil à main classique (balai, pelle, binette...). Attendez que la fondatrice soit à l'intérieur et écrasez le tout. En cas d'allergie connue aux piqûres d'hyménoptères abstenez-vous et prévenez votre Mairie.

Vous pouvez également solliciter le référent local (coordonnées en Mairie) qui pourra se charger de cette destruction.

Si vous observez plusieurs frelons asiatiques dans le nid, n'intervenez pas vous-même.

Ces destructions précoces limitent la propagation de l'espèce et réduisent les coûts engagés par les collectivités pour intervenir plus tard en saison, sur des nids plus difficilement accessibles et nécessitant un équipement spécifique.

